



CONCURSO PÚBLICO



Nome: \_\_\_\_\_



**29 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PROVA 01**

**PROVA ESCRITA OBJETIVA  
CADERNO DE QUESTÕES**

**Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura deste caderno de questões.**

1. **Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.** Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A não assinatura incide na **DECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO**.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
5. O tempo disponível para esta prova é de **3h**.
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal **SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA**, juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
8. Você também será excluído do certame caso:
  - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
  - b) Ausente-se da sala em que realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou CARTÃO-RESPOSTA, antes do prazo estabelecido.
  - c) Deixe de assinalar corretamente o campo no CARTÃO-RESPOSTA.
  - d) Seja um dos três últimos candidatos e deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.

**GABARITO**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

**Prefeitura Municipal de Teutônia – RS  
Concurso Público – 001/2023**



**29 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PROVA 01****CONHECIMENTOS GERAIS****TEXTO**

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 15 milhões de brasileiros que moram em áreas urbanas e 2,3 milhões de moradores rurais não têm acesso a fontes seguras de água para suas necessidades domésticas e pessoais. A má higienização causada pela falta de água potável é um fator de maior vulnerabilidade para doenças adquiridas através do consumo de alimentos e água contaminados. Esse é o caso da toxoplasmose, prevalente em todo Brasil.

Embora as autoridades não a reconheçam como doença negligenciada, o país ocupa o topo da lista de surtos e casos de toxoplasmose no mundo. Entre 2010 e 2018, foram registrados 14 surtos no Brasil, correspondendo a 56% dos 25 notificados nos últimos 50 anos.

Além de ser transmitido por via oral, o parasita *Toxoplasma gondii* é capaz de ultrapassar barreiras importantes do nosso organismo, como a placenta. [...] Nos bebês, a toxoplasmose congênita pode ser assintomática, além de provocar sintomas graves, como atraso no desenvolvimento, cegueira, hidrocefalia. Dentre os fatores que contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação em que o feto foi infectado. [...]

Embora a maioria dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita sejam assintomáticos, os sinais da tríade clássica da doença – retinocoroidite, calcificação intracraniana e hidrocefalia – ocorrem em mais de 10% dos indivíduos desse grupo. Há outros casos também em que a doença se manifesta com sinais não específicos de infecção aguda, como convulsões, aumento do baço e fígado, febre, anemia, entre outros.

Alguns dos recém-nascidos desse grupo podem desenvolver sintomas clínicos e deficiências na vida adulta, afetando, sobretudo, a visão. [...]

Mas não é apenas por causa do risco de infecção em bebês e pessoas imunossuprimidas que devemos ficar atentos a essa doença. A incidência de pessoas com problemas de visão no nosso território, tanto naquelas saudáveis quanto nas que têm algum tipo de comprometimento no sistema imunológico é alta.

No Sul, diversos grupos de pesquisadores e médicos da região mostraram que a alta incidência de quadros oculares no Brasil tem relação com a circulação de genótipos atípicos de *Toxoplasma gondii*, sendo que nenhum deles é mais dominante do que os outros. [...]

Os problemas de visão ocorrem pela infecção do *Toxoplasma gondii* na região mais interna do olho conhecida como úvea posterior; especificamente, nos tecidos coróide e retina. A coróide é bastante vascularizada, importante para a nutrição dos fotorreceptores localizados na parte mais externa da retina. A retina é responsável pela captação de luz que irá formar as imagens enviadas para interpretação no cérebro. Uma vez que a lesão alcança áreas da retina com maior número de fotorreceptores, como a mácula e a fóvea, o paciente pode apresentar baixa visão ou até desenvolver a cegueira. [...]

Um estudo publicado, em 2022, mostrou a importância da atenção à toxoplasmose ocular nos diagnósticos de uveítes posteriores. Após avaliar mais de 3 mil pacientes, os autores relataram que, atualmente, a toxoplasmose é a principal causa de retinocoroidite (inflamação da retina e da coróide), atingindo principalmente a população em idade mais produtiva, ou seja, inserida no mercado de trabalho. Essa constatação revela que o impacto da toxoplasmose ocular não se restringe apenas à qualidade de vida do paciente, inclui também perdas econômicas e sociais para o país.

Popularmente, a toxoplasmose é conhecida como a ‘doença do gato’. De forma equivocada, acredita-se que a transmissão da doença ocorra apenas através do contato da boca com as mãos contendo restos de fezes de gatos domésticos. A infecção ocorreria durante a limpeza das caixas de areia, onde se encontram as fezes contaminadas com o *Toxoplasma gondii*, na forma de oocistos. [...]

Estudo realizado na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) mostrou que o consumo de água não-tratada adequadamente pode aumentar em até três vezes o risco de contrair essa infecção. [...]

A OMS classifica a toxoplasmose como “doença transmitida por alimentos contaminados”, uma vez que a via oral é a principal rota de transmissão. Nesse caso, a infecção ocorre pelo consumo de água, frutas e verduras contaminadas com oocistos ou de carnes cruas ou mal passadas



(sobretudo, porcos, ovinos e bovinos) também contaminadas com cistos. [...]

Por conta da pressão do sistema imune para combater a infecção, o *Toxoplasma gondii* inicia o processo de ‘encistamento’ para se proteger. Durante esse processo, o parasita diminui o seu ritmo de replicação e permanece em estado ‘adormecido’ nos músculos, cérebro, coração e outros órgãos do hospedeiro, até ter condições de retornar à fase de multiplicação rápida e continuar sua disseminação pelo organismo, ou passar para outro animal que tenha ingerido partes do seu corpo contaminado. [...]

A transfusão de sangue, o transplante de órgãos e o compartilhamento de agulhas também são formas de transmissão dessa parasitose. Por isso, o controle de qualidade e da presença de *T. gondii*, principalmente em concentrado de linfócitos para determinadas transfusões, é fundamental. Esse parasito não infecta hemácias, mas pode infectar e ‘pegar carona’ em outras células do sangue.

Apesar de existir tratamento para a toxoplasmose, as medicações utilizadas são as mesmas descobertas na década de 1950, que têm ação apenas durante a fase aguda da doença, quando o parasito ainda não se transformou em cisto. O tratamento da toxoplasmose humana ainda conta com a combinação de dois medicamentos: sulfonamidas e derivados diaminopirimidínicos. Estes medicamentos são em sinergia à soma das ações de cada medicamento para inibir a síntese de folato.

Para evitar que apareçam efeitos adversos decorrentes do bloqueio da produção de folato, recomenda-se que o paciente tome suplementos de ácido fólico. Entre os efeitos adversos, estão a anemia megaloblástica [...], reações de hipersensibilidade às sulfonamidas e necrose hepática. Por causa disso e do tratamento ser longo, ao menos 30% das pessoas deixam de se tratar. [...]

ARAÚJO, M. R. P. de; VOMMARO, R. C. *Toda a atenção para a toxoplasmose*. In: Revista Ciência Hoje [CH 397]. Disponível em: <<https://cienciahoje.org.br/artigo/toda-a-atencao-para-a-toxoplasmose/>>. Último acesso em 12 de junho de 2023. (Adaptado)

### Questão 01

“Embora as autoridades não a reconheçam como doença negligenciada, o país ocupa o topo da lista de surtos e casos de toxoplasmose no mundo”.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a expressão que substitui, sem

prejuízo semântico, o termo destacado no trecho acima.

- a) Nociva.
- b) Esquecida.
- c) Grave.
- d) Erradicada.
- e) Debelada.

### Questão 02

“A má higienização causada pela falta de água potável é um fator de maior vulnerabilidade para doenças adquiridas através do consumo de alimentos e água contaminados. Esse é o caso da toxoplasmose, prevalente em todo Brasil.”

Assinale a alternativa que apresenta o significado CORRETO do termo destacado no trecho acima.

- a) O que é usado para suprir danos, falhas.
- b) Aquilo que se sobressai em relação aos demais.
- c) O que está por completo, inteiro.
- d) Aquilo que se encontra por todo lugar.
- e) O que é eliminado por um período e reaparece.

### Questão 03

Em “Alguns dos recém-nascidos desse grupo podem desenvolver sintomas clínicos e deficiências na vida adulta, afetando, sobretudo, a visão”, os termos destacados devem ser classificados, respectivamente, como:

- a) Pronome indefinido, substantivo, preposição.
- b) Advérbio, adjetivo, advérbio.
- c) Numeral, substantivo, preposição.
- d) Pronome relativo, adjetivo, preposição.
- e) Pronome indefinido, adjetivo, advérbio.

### Questão 04

“Dentre os fatores que contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação em que o feto foi infectado.”

Assinale a alternativa que reescreve CORRETAMENTE o trecho acima de acordo com a norma culta e as relações sintático-semânticas do período.

- a) Dentre os fatores pelos quais contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação no qual o feto foi infectado.
- b) Dentre os fatores os quais contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação no qual o feto foi infectado.



- c) Dentre os fatores que contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação que o feto foi infectado.
- d) Dentre os fatores os quais contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação onde o feto foi infectado.
- e) Dentre os fatores nos quais contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação em que o feto foi infectado.

**Questão 05**

A palavra “hipersensibilidade” é formada pelo mesmo processo de formação que em:

- a) Hospedeiro.
- b) Tratamento.
- c) Consumo.
- d) Assintomática.
- e) Infelizmente.

**Questão 06**

“A incidência de pessoas com problemas de visão no nosso território, tanto naquelas saudáveis quanto nas que têm algum tipo de comprometimento no sistema imunológico é alta”.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o referente retomado pelo termo em destaque no trecho acima.

- a) “naquelas saudáveis”.
- b) “pessoas com problemas de visão”.
- c) “Pessoas”.
- d) Aquelas pessoas saudáveis.
- e) “A incidência de pessoas”.

**Questão 07**

No trecho “Para evitar que apareçam efeitos adversos decorrentes do bloqueio da produção de folato, recomenda-se que o paciente tome suplementos de ácido fólico”, o trecho destacado exerce a função sintática de:

- a) Objeto indireto.
- b) Adjunto adverbial.
- c) Objeto direto.
- d) Complemento nominal.
- e) Sujeito.

**Questão 08**

Em “A retina é responsável pela captação de luz que irá formar as imagens enviadas para interpretação no cérebro”, o termo oracional está devidamente classificado como:

- a) Complemento nominal.
- b) Agente da passiva.
- c) Adjunto adnominal.

- d) Predicativo do sujeito.
- e) Agente circunstancial.

**Questão 09**

Assinale a alternativa que apresenta em destaque um termo oracional com a função de objeto indireto.

- a) “Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 15 milhões de brasileiros que moram em áreas urbanas e 2,3 milhões de moradores rurais não têm acesso a fontes seguras de água para suas necessidades domésticas e pessoais”.
- b) “Além de ser transmitido por via oral, o parasita *Toxoplasma gondii* é capaz de ultrapassar barreiras importantes do nosso organismo, como a placenta”.
- c) “Essa constatação revela que o impacto da toxoplasmose ocular não se restringe apenas à qualidade de vida do paciente, inclui também perdas econômicas e sociais para o país”.
- d) “Estudo realizado na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) mostrou que o consumo de água não-tratada adequadamente pode aumentar em até três vezes o risco de contrair essa infecção”.
- e) “O tratamento da toxoplasmose humana ainda conta com a combinação de dois medicamentos.”

**Questão 10**

“Uma vez que a lesão alcança áreas da retina com maior número de fotorreceptores, como a mácula e a fóvea, o paciente pode apresentar baixa visão ou até desenvolver a cegueira.” A locução conjuntiva destacada no trecho introduz a noção de:

- a) Causa.
- b) Oposição.
- c) Condição.
- d) Consequência.
- e) Concessão.

**Questão 11**

Leia com atenção as afirmações:

- Todo gato é um animal.
- Todo animal tem quatro patas.

Pode-se concluir que:

- a) Todo gato tem quatro patas.
- b) Todo animal é um gato.
- c) Todo gato tem uma pata.
- d) Nem todo animal é um gato.
- e) Nem todo gato é um animal.





## CONCURSO PÚBLICO



### Questão 12

Na sequência decrescente a seguir:  $2^n, 2^{n-1}, \dots, 2^{n-4}$  ( $n$  é um número natural), a mediana dos elementos dessa sequência é 8. Assinale a alternativa que representa o valor de “ $n$ ”.

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.
- e) 6.

### Questão 13

Em uma pesquisa de opinião realizada com 50 pessoas, foram registrados os seguintes números de filhos por família: 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 14.

Assinale a alternativa que representa a Moda desta distribuição.

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 8.
- e) 3.

### Questão 14

Junto a uma parede, com altura de 10 metros, pretende-se completar uma cerca retangular com 80 metros de perímetro. Assinale qual a área máxima possível.

- a)  $800\text{m}^2$
- b)  $650\text{m}^2$
- c)  $500\text{m}^2$
- d)  $400\text{m}^2$
- e)  $250\text{m}^2$

### Questão 15

O adicional por tempo de serviço é devido à razão de \_\_\_\_\_ por ano de serviço público prestado ao Município sob qualquer forma de contratação, incidente sobre o vencimento da classe ou padrão do servidor ocupante de cargo efetivo. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna, conforme Estatuto do Servidor Público do Município de Teutônia/RS.

- a) 1%.
- b) 2%.
- c) 0,5%.
- d) 3%.
- e) 1,5%.

### Questão 16

Conforme a Lei nº 4.350/14, que institui o regime próprio de previdência social do município de

Teutônia/RS, são atribuições do Setor de Previdência Municipal, EXCETO.

- a) Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Administração do RPPS – CARPPS.
- b) Promover os reajustes dos benefícios na forma prevista em decreto e encaminhá-las ao Tribunal de Contas.
- c) Executar as atividades administrativas do RPPS.
- d) Submeter as contas anuais do RPPS à deliberação do CARPPS e encaminhá-las ao Tribunal de Contas.
- e) Praticar os atos referentes à inscrição de segurados ativos, inativos, dependentes e pensionistas, bem como sua exclusão.


### Questão 17

Conforme Lei nº 4.350/14, as receitas decorrentes de investimentos e as patrimoniais são consideradas:

- a) Fontes de financiamento do plano padrão do regime próprio de previdência social.
- b) Fontes operacionais do plano de custeio do regime próprio de previdência social.
- c) Fontes de financiamento do plano de custeio do regime próprio de previdência social.
- d) Fontes secundárias do plano de atividade do regime próprio de previdência social.
- e) Fontes de financiamento de forma direta do plano padrão do regime próprio de previdência social.

### Questão 18

Nos parques tecnológicos, é comum aos usuários do Microsoft Windows verificar e ajustar diversos recursos do computador. Imagine que um usuário está em um computador com Windows 11 e a área de notificação apresenta-se como a imagem a seguir.





O usuário precisa ativar o recurso do Windows que filtra a luz azul para fornecer cores mais quentes e mais agradáveis aos seus olhos durante longos períodos de trabalho.

Baseado no exposto acima, assinale a alternativa que traz o nome do recurso da área de notificação a ser acionado pelo usuário para realizar a configuração desejada.

- a) Bluetooth.
- b) Modo Avião.
- c) Luz Noturna.
- d) Acessibilidade.
- e) Economia de Bateria.

### Questão 19

Caso o servidor público tenha extinguido o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração \_\_\_\_\_, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Conforme a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna.

- a) Integral ao tempo de serviço.
- b) Proporcional ao tempo de serviço.
- c) Reduzida, conforme tempo de serviço.
- d) Proporcional ao tempo da disponibilidade.
- e) Reduzida, conforme tempo da disponibilidade.

### Questão 20

São símbolos da República Federativa do Brasil, EXCETO:

- a) Palácio do Planalto.
- b) Selo nacional.
- c) Armas.
- d) Hino.
- e) Bandeira.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 21

O propósito ou meta de humanizar, em todos os sentidos apontados, mais objetivamente no caso da saúde, implica aceitar e reconhecer que nessa área e nas suas práticas, em especial, subsistem sérios problemas e carências de muitas das condições exigidas pela definição da concepção, organização e implementação do cuidado da saúde da humanidade, tanto por parte dos organismos e práticas estatais, como da sociedade civil. Sobre o tema, analise os itens abaixo:

- I- Se tivesse que resumir a missão de humanização num sentido amplo, além da melhora do tratamento

intersubjetivo, dir-se-ia que se trata de incentivar, por todos os meios possíveis, a união e colaboração interdisciplinar de todos os envolvidos.

- II- Humanizar é apenas “amenizar” a convivência hospitalar, buscando tão somente diminuir a dor e o desconforto dos pacientes.
- III- humanizar a assistência em saúde implica dar lugar tanto à palavra do usuário quanto à palavra dos profissionais da saúde, de forma que possam fazer parte de uma rede de diálogo, que pense e promova as ações, campanhas, programas e políticas assistenciais a partir da dignidade ética da palavra, do respeito, do reconhecimento mútuo e da solidariedade.
- IV- O contato direto com seres humanos coloca o profissional diante de sua própria vida, saúde ou doença, dos próprios conflitos e frustrações. Se ele não tomar contato com esses fenômenos correrá o risco de desenvolver mecanismos rígidos de defesa, que podem prejudicá-lo tanto no âmbito profissional quanto no pessoal.

Analisados os itens, é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o item I está incorreto.
- b) Apenas o item II está incorreto.
- c) Apenas o item III está incorreto.
- d) Apenas o item IV está incorreto.
- e) Apenas os itens II e IV estão incorretos.

### Questão 22

Segundo a resolução COFEN 311/2007, em relação à administração de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O profissional pode administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga, desde que esteja prescrito.
- b) O técnico de enfermagem pode prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, desde que tenha embasamento científico para isso.
- c) O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegitimidade.
- d) O profissional de enfermagem pode assinar as ações de enfermagem que não executou, desde que esteja ciente de que a medicação foi administrada.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

### Questão 23

O técnico de enfermagem deve estar preparado para atender vítimas de queimaduras de todas as idades, visto que esse tipo de acidente atinge todas as faixas etárias e todas as camadas sociais. Lesões decorrentes de queimaduras são causas importantes de morbidade e mortalidade. São causadas por diferentes agentes, nos



diferentes ambientes e em situações acidentais ou provocadas, como suicídio e violência. Analise as assertivas abaixo e assinale, em seguida, a alternativa que apresenta as CORRETAS:

- I- É preciso classificar as queimaduras de acordo com a profundidade do tecido lesado e extensão da lesão, com a finalidade de orientar os cuidados a serem prestados. As lesões de primeiro grau provocam eritema, dor local e formam bolhas, atingindo a epiderme e parte da derme. As de segundo grau atingem derme e epiderme, com formação de bolhas, eritema e sem formação de bolhas. As de terceiro grau atingem epiderme, derme e músculos e as lesões são secas, vermelhas e com a presença de muitas bolhas.
- II- O paciente Pequeno Queimado tem comprometimento de até 10% da superfície corporal; o Médio Queimado tem lesões em até 20% de sua superfície corporal; já o Grande Queimado apresenta lesões em mais de 20% de sua superfície corporal (em adultos).
- III- No atendimento da vítima de queimaduras, é necessário seguir as etapas do ABCDE, segundo o Advanced Trauma Life Support Course (ATLS, 2008), ao mesmo tempo identificando lesões que coloquem a vítima de risco de vida ou em situações incapacitantes. A este atendimento deve ser acrescentada a observação de algumas particularidades relacionadas ao paciente queimado que poderão auxiliar na escolha e/ou indicação do tratamento.
- IV- A limpeza das lesões de queimadura deve ser realizada no atendimento inicial, sendo feita com sabão e solução fisiológica. Não se deve retirar nenhuma parte do tecido desvitalizado ou necrosado, mesmo que sejam facilmente removíveis. A lesão não deve ser ocluída.
- V- Em casos de queimaduras de terceiro grau o paciente deve ser encaminhado imediatamente a um centro especializado, após estabilização. A temperatura do ambiente deve ficar em torno de 42°C, devido à impossibilidade de se usar mantas para prevenir a hipotermia.
- VI- São dois os fatores que influenciam a gravidade de lesões de queimaduras químicas: a concentração do produto e a duração do contato. Essas informações devem ser obtidas no atendimento pré-hospitalar e os profissionais devem ter cuidado com sua proteção do contato com a substância.
- VII- No caso de queimaduras elétricas, o técnico deve ficar atento quanto aos parâmetros vitais, estabelecendo a monitorização cardíaca e providenciando acesso venoso o menos calibroso

possível, para não traumatizar ainda mais a vítima. Esta não deve receber quantidades grandes de líquido.

- a) I, II, III, VI.                      b) II, III, V, VII.  
c) II, III, V.                          d) I, IV, VI.  
e) II, III, V, VII.

**Questão 24**

Sobre a angina do peito, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Na angina variante, o paciente tem alterações eletrocardiográficas, mas não refere nenhuma dor.  
b) A angina instável tem melhora do quadro à medida em que o paciente repousa e faz uso de nitroglicerina.  
c) Administrar a prescrição de nitroglicerina prescrita, sempre por via endovenosa.  
d) Angina de peito é uma síndrome clínica de desconforto ou pressão precordial decorrente de isquemia miocárdica transitória com infarto.  
e) O paciente deve ser orientado a interromper as atividades e sentar-se ou repousar no leito na posição de semi-Fowler, desse modo, reduzindo as necessidades de oxigênio do miocárdio isquêmico.

**Questão 25**

Leia o enunciado e responda:

É um óleo vegetal e protege a ferida preservando o tecido vitalizado, mantendo úmido o meio e evitando a aderência ao leito da lesão. O enunciado trata de:

- a) Óleo de coco.  
b) Ácido graxo essencial.  
c) Hidrocoloide.  
d) Óleo de copaíba.  
e) Óleo de jojoba.

**Questão 26**

A necrose do tecido provocada pela dificuldade de circulação nas regiões pressionadas, em razão do tempo em que o paciente está acamado, é denominado de:

- a) Feridas.  
b) Escaras.  
c) Lesões.  
d) Distúrbios.  
e) Queloides.

**Questão 27**

A imunização é definida como a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa. Prática que tem como objetivo aumentar a resistência de um indivíduo contra infecções. Acerca deste assunto, analise as alternativas marcando V para verdadeiro ou F para falso e, a seguir, assinale a alternativa CORRETA.



- ( ) O intervalo entre as doses de vacina do HPV não deve ser superior a 12-15 meses, para que o esquema vacinal seja completado o mais prontamente, visando garantir uma elevada produção de anticorpos e a efetividade da vacinação.
- ( ) A vacina pentavalente será contraindicada quando houver quadro neurológico em atividade e/ou após administração da vacina.
- ( ) A vacina BCG deverá ser administrada preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida.
- ( ) A vacina contra Hepatite B deverá ser administrada na dose de 0,5ml em indivíduos de até 19 anos de idade, e 1,0ml a partir de 20 anos de idade.

- a) V-V-V-F.                      b) F-F-F-V.  
c) F-F-F-F.                      d) V-V-V-V.  
e) F-V-V-F.

#### Questão 28

O Decreto nº 94.406/87 regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem e dá outras providências. Em seu art. 10, trata sobre o exercício do técnico de enfermagem, que deve assistir o enfermeiro em ações como:

- I- No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem.
- II- Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave.
- III- Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os itens I, II e III são verdadeiros.  
b) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  
c) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  
d) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  
e) Apenas o item I é verdadeiro.

#### Questão 29

Tomando como base o calendário de vacinação para 2018, numere a coluna B de acordo com a Coluna A:

##### Coluna A

- I- Meningocócica C.  
II- Pentavalente.  
III- Pneumocócica 10 Valente.

##### Coluna B

- ( ) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por HiB.

- ( ) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo.  
( ) Previne contra doença invasiva causada por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) II – III – I.  
b) I – II – III.  
c) III – II – I.  
d) I – III – II.  
e) II – I – III.

#### Questão 30

O Técnico de Enfermagem recebeu a seguinte prescrição: Administrar 500 ml de soro fisiológico a 0,9% em 30 minutos. Assinale quantas gotas deverão correr por minuto.

- a) 6 gotas/minuto.  
b) 12 gotas/ minuto.  
c) 30 gotas/ minuto.  
d) 333 gotas/minuto.  
e) 999 gotas/ minuto.

#### Questão 31

A via de administração intramuscular é muito utilizada por conta de sua rápida velocidade de absorção. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao volume máximo que se deve administrar por esta via, especificamente na região do músculo deltoide em um adulto:

- a) 2 ml.                              b) 3 ml.  
c) 4 ml.                              d) 5 ml.  
e) 6 ml.

#### Questão 32

Uma das formas de se minimizar os riscos de contaminação é através da divisão das áreas pela classificação do risco de contaminação. Com relação à classificação das áreas pelo risco de contaminação, analise os itens abaixo:

- ( ) Áreas não críticas são todas as áreas hospitalares não ocupadas por pacientes, como, por exemplo: escritórios e depósitos.
- ( ) São exemplos de áreas semicríticas: laboratório de análises clínicas, banco de sangue e sala de hemodiálise.
- ( ) Áreas contaminadas são aquelas em que se verifica a presença de sangue, pus e secreções ou excreções.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) V-V-V.                              b) F-F-F.





- c) F-V-F.  
e) V-F-V.

- d) V-F-F.

**Questão 33**

A assistência de enfermagem tem papel fundamental durante a coleta de exames laboratoriais. A respeito da assistência de enfermagem durante a coleta do hemograma, analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- I- A assistência de enfermagem engloba a instrução do paciente quanto ao preparo para a realização do hemograma.  
II- A punção e o manuseio do garrote não interferem na distribuição de alguns constituintes do sangue.  
III- Deve-se realizar a identificação correta dos tubos de coleta e a assepsia do local da punção após a palpação.

- a) I, II e III estão corretos.      b) I e III estão corretos.  
c) Apenas II é correto.            d) Apenas III é correto.  
e) II e III estão corretos.

**Questão 34**

A síncope é a perda súbita da consciência, que pode ser de curta duração, que não necessite de intervenções específicas para recuperação do paciente. Ocorre devido à diminuição da atividade cerebral. Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito às síncopes e como socorrer a vítima nesse caso:

- a) A síncope vasogênica é causada por distúrbios metabólicos como hiperglicemia ou hipoglicemia. A vítima apresenta palidez cutânea, respiração suspirosa, queixa de visão embaçada, tontura e em seguida ocorre o desmaio. A neurogênica ocorre pela súbita queda da pressão arterial.  
b) No atendimento pré-hospitalar, deve-se evitar conversar com a vítima, pois ela está confusa e pode não responder aos questionamentos de forma adequada.  
c) A vítima deve ser mantida deitada, com a cabeça abaixo do ombro. Deve ter os sinais vitais verificados e fazer um teste de glicemia; se for necessário, administrar oxigênio sob orientação médica. Os curiosos devem ser mantidos longe e não se pode dar água ou nenhum outro tipo de líquido antes da vítima estar totalmente acordada.  
d) Quando não se trata de trauma, a dificuldade do socorrista em identificar a causa é menor; a pessoa deve ser mantida com a cabeça no mesmo nível do resto do corpo.  
e) Todas as alternativas estão incorretas.

**Questão 35**

O choque é uma condição em que o sistema cardiovascular fica impossibilitado de manter a perfusão tecidual adequada, por vários motivos. Quando há demora no reconhecimento e tratamento, ocorre mais rapidamente a falência de múltiplos órgãos e óbito. Assim, para que as ações ajudem na identificação precoce do choque em situações de urgência e emergência, é importante a compreensão de como se dá esse fenômeno, entendendo sua classificação, fisiopatologia, tratamento e cuidados de enfermagem. Assinale a alternativa INCORRETA relacionada ao tema:

- a) No atendimento pré-hospitalar em situações de trauma é importante que o técnico identifique sinais de choque hipovolêmico.  
b) No atendimento pré-hospitalar em situações de trauma, pode ser percebida a alteração do nível de consciência, seguida de confusão mental e a vítima se torna irresponsiva devido à deterioração da perfusão cerebral.  
c) Quando há hemorragias, os mecanismos compensatórios ativam o sistema nervoso central, promovendo a diminuição da frequência cardíaca e respiratória e a vasodilatação periférica.  
d) No atendimento inicial ao paciente vítima de choque hipovolêmico, em eventos traumáticos, todos os esforços são voltados para a identificação da lesão responsável pelo choque. A prioridade é estabelecer o quadro hemodinâmico do paciente, infundindo soluções aquecidas isotônicas e avaliando a resposta da vítima ao tratamento.  
e) São respostas da vítima na avaliação do tratamento para o choque hipovolêmico: resposta rápida, quando os parâmetros vitais melhoram e a vítima perdeu menos de 20% do volume sanguíneo; resposta transitória, quando apresenta melhora dos parâmetros vitais e volta a piorar hemodinamicamente, com perda de 20 a 40% da volemia e resposta mínima ou ausente, quando a vítima não apresenta melhora na fase de reanimação com reposição de solução isotônica.

**Questão 36**

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil e do mundo. É importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças renais e cardiovasculares maiores. A emergência hipertensiva requer redução rápida da pressão arterial e representa risco imediato à vida.

Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito à crise hipertensiva.



## CONCURSO PÚBLICO



- a) Um dos maiores riscos da crise hipertensiva são lesões a órgãos alvo, como tireoide, fígado, baço e coração. Quando a diastólica é menor do que 130mmHg e maior do que 100mmHg, há a necessidade de intervenção rápida.
- b) São algumas condições que podem desencadear a crise hipertensiva: edema agudo de pulmão, uremia, hemorragia cerebral, encefalites, epilepsia, ansiedade com hiperventilação, ingestão excessiva de drogas, dissecação de aorta, infarto agudo do miocárdio.
- c) O princípio para o tratamento da crise hipertensiva difere na urgência e na emergência. O principal objetivo é fazer com que as lesões dos órgãos alvo sejam reversíveis.
- d) Nas emergências hipertensivas são utilizadas drogas por via endovenosa, de ação rápida a fim de se reduzir logo a pressão arterial.
- e) Nas emergências hipertensivas são utilizadas drogas por via endovenosa, de ação rápida a fim de evitar lesões em órgãos alvo.

### Questão 37

De acordo com a ANVISA, a higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Sobre o processo de higienização das mãos, julgue as assertivas atribuindo V para o item verdadeiro e F para o item falso.

- A higienização apropriada das mãos com preparação alcoólica (sob as formas gel, solução, espuma e outras) não é apropriada, mesmo quando elas não estiverem visivelmente sujas.
- A técnica de higienização simples das mãos com água e sabão requer tempo de duração do procedimento de 40 a 60 segundos.
- Deve-se incentivar o uso coletivo de toalhas de tecido, pois estas impedem a proliferação bacteriana.

Julgadas as assertivas, assinale a alternativa que agrupa a sequência CORRETA.

- a) V-V-V.
- b) V-F-F.
- c) F-V-F.
- d) F-F-V.
- e) F-V-V.

### Questão 38

Foram prescritos 500 ml de soro glicosado a 10 %. Na unidade de saúde os profissionais só dispõem de 500 ml de soro glicosado 5% e ampolas de 20ml de glicose 50%. A quantidade em ml da ampola de glicose que deve ser adicionada é de:

- a) 20 ml.
- b) 25 ml.
- c) 30 ml.
- d) 40 ml.
- e) 50 ml.

### Questão 39

Um paciente, 42 anos, sexo masculino, deu entrada na emergência de um hospital de grande porte após ingestão de grandes quantidades de Haloperidol. Assinale qual medicamento/antídoto deve ser utilizado nesta situação.

- a) Pralidoxima.
- b) Sulfato Ferroso.
- c) Biperideno.
- d) Naloxona.
- e) Noripurum.

### Questão 40

Sobre a classificação de Hipertensão estágio 3, da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, de acordo com a medição casual ou no consultório a partir de 18 anos de idade, é CORRETO afirmar:

- a) É considerada Hipertensão estágio 3 se pressão arterial sistólica  $\geq 180$  mm Hg e/ou pressão arterial diastólica  $\geq 110$  mmHg.
- b) É considerada Hipertensão estágio 3 se pressão arterial sistólica entre 160 – 179 mm Hg e/ou pressão arterial diastólica entre 100 - 109 mmHg.
- c) É considerada Hipertensão estágio 3 se pressão arterial sistólica  $\leq 120$  mm Hg e/ou pressão arterial diastólica  $\leq 80$  mmHg.
- d) É considerada Hipertensão estágio 3 se pressão arterial sistólica entre 140 – 159 mm Hg e/ou pressão arterial diastólica entre 90 – 99 mmHg.
- e) Todas as alternativas estão incorretas.