

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA- MG

**DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO
PRELIMINAR**

**I
DOS RECURSOS**

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados, concorrentes ao cargo, **ODONTÓLOGO** que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no **CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA - MG, CONFORME EDITAL 001/2017.**

RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA

| QUESTÕES |
|----------|
| 11 |
| 27 |
| 28 |
| 50 |

II

**DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS
ANÁLISE DOS RECURSOS**

Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:

Questão 11

Não procedem as alegações do recorrente.

INDEFERIDO

Questão 27

Procedem as alegações do recorrente.

QUESTÃO NULA

DEFERIDO

Questão 28

Procedem as alegações do recorrente.

QUESTÃO NULA

DEFERIDO

Questão 50

Não procedem as alegações do recorrente.

A resposta do gabarito da questão 50 está correta (item C), pois o dente 22, em questão, necessita ser reposicionado e receber, posteriormente, contenção semi-rígida, já que sofreu luxação extrusiva, de acordo com diversas fontes na literatura:

“ Na extrusão , o tratamento imediato consiste na redução da luxação , reposicionando o dente à sua posição original e contenção semirrígida por 14 dias. Esse tipo de tratamento será igual para os dentes decíduos e permanentes’

Odontopediatria 9º edição –

Antonio Carlos Guedes – Pinto - (pg 768)

“ Luxação extrusiva : O elemento dental se desloca parcialmente no sentido axial do alvéolo dental. Presença de sangramento e aparência do dente alongado . Tratamento: Reposicionamento do elemento dental e contenção semirrígida por duas semanas” .

Urgências em traumatismos dentários: classificação, características e procedimentos

Mariane Emi Sanabe¹ e col. - Rev Paul Pediatr 2009;27(4):447-51 – (Tabela 2)

Na luxação extrusiva recomenda-se “Reposicionar o dente com pressão digital. Estabilizar o dente com contenção semirígida por até 3 semanas. Realizar alívio oclusal”

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO – DENTES TRAUMATIZADOS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE DE SÃO PAULO
PROF DR CELSO LUIZ CALDEIRA (pg 23)

“Na luxação extrusiva, o dente é deslocado parcial e axialmente para fora do alvéolo, com maior mobilidade que os adjacentes, ocorrendo, normalmente, sangramento do sulco gengival. É indicada a reposição do dente extruído, com contenção semi-rígida por 2 a 3 semanas. A contenção rígida é indicada, quando ocorrer simultaneamente fratura radicular ou do processo alveolar, devendo ser mantida por 2 a 3 meses

TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR: REVISÃO DE LITERATURA

Flávio Augusto Marsiaj OLIVEIRA* ET all
Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - 2004 -(pg 18)

INDEFERIDO



III DAS CONCLUSÕES

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os mesmos foram julgados **DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS** de acordo com as decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 001/2017 que rege este concurso. Fica reiterado que “*A Banca Examinadora se constitui na última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais*”.

Publique-se,

Fortaleza – CE 29 de março de 2018.

CONSULPAM